


Avertissements agricoles

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 14-8-87508697

ILE DE FRANCE



Ministère de l'Agriculture
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
47, Rue Paul Doumer - 93100 MONTREUIL.
tél : 42/87/76/71.



PUBLICATION PERIODIQUE CPP N° 536 A D
Abonnement annuel : 150 F.
Régisseur des Recettes : D.D.A. D.R.A.F.
C.C.P. 9063 96 U PARIS .

EDITION GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 367 DU 8 JUILLET 1987 - ENVOI N° 16


TOURNESOL	:	Les pucerons disparaissent enfin.
MAIS	:	Traitement pyrale en secteurs précoces.
BETTERAVE	:	Les maladies en couleur.

M. HANRION

TOURNESOL

■ **STADE** : irrégulier, du bouton floral de 2cm de diamètre (stade E2), au bouton dégagé. (avec les bractées qui commencent à se déployer - stade E4).

■ **MALADIES** : Suite à l'augmentation des températures, l'extension des symptômes de sclérotinia a été freinée vers la mi-juin.



■ **PUCERONS** : Depuis le 25 juin, les populations de pucerons régressent naturellement de façon très sensible. (50% de mortalité en une semaine).

En effet :

- la chaleur et l'humidité élevée des 27 et 28 juin ont favorisé le développement de champignons parasites des pucerons (mycoses). - Remarque : lorsqu'un traitement fongicide a été réalisé fin juin, les mycoses alors détruites, ne peuvent plus jouer leur rôle de "nettoyage" des ravageurs ;

- l'augmentation des températures a permis l'installation et la ponte de nombreux auxiliaires. (syrphes essentiellement : jusqu'à 3 larves présentes par pied). Rappelons qu'une larve de syrpe peut consommer jusqu'à 700 pucerons dans sa vie. Il est donc inutile d'envisager un traitement aphicide actuellement.

Remarque : Il n'existe aucune relation pucerons - maladie.



larve
de syrpe
translucide (3mm à 1cm)

M A I S

■ **PYRALE** : * Le vol en cage d'élevage (située à MONTREUIL S/BOIS), a débuté le 30 JUIN. Les premières pontes ont été trouvées les 4 et 7 juillet dans les secteurs précoces (3 à 10 pontes pour 100 pieds) et les premières éclosions auront lieu entre le 10 et le 13 juillet.

* Date des traitements (à confirmer dans un prochain bulletin pour les zones tardives):

. Vallée de la Seine, de la Marne, du Morin ; région de Brie Comte Robert, Melun, Provins et tout le Sud Seine et Marne et Sud de l'Essonne : du 12 au 17 juillet 1987.

. Pourront être traités avec deux ou trois jours de retard, le secteur de Villiers st Georges et les parcelles situées en coteaux des vallées citées ci-dessus.

. Brie Centrale, Ferté Gaucher, Rebais, Yvelines : les pièges sexuels indiquent un décalage de 7 jours avec les vallées: traitement du 19 au 24 juillet.

. Val d'Oise : du 22 au 27 juillet .

* Produits autorisés :

efficacité :

Formulation	Matière active	Produit commercial	Dose P.C./ha	Efficacité
Granulés	Chlorpyrifos-éthyl	Dursban 1,5 G	25 kg	
	Cyperméthrine	Ripcord G, Sherpa 2 G	25 kg	
	Deltaméthrine	Décis MG2	25 kg	
	Fenitrothion	Dotix	25 kg	
	Parathion éthyl	Kriss 2,5 G	25 kg	
	Permethrine	Granador, Perthrine MG	25 kg	
	Phoxime	Volaton 2,5	25 kg	
	Profénofos	Pizirol super 3 G	25 kg	
Liquides	Alphaméthrine	Fastac ⁽¹⁾	0,6 l	
	Cyhalothrine	Karate ⁽¹⁾	0,4 l	
	Cyperméthrine	Nombreux ⁽¹⁾	75 g ma/ha	
	Deltaméthrine	Décis CE ^{(1) (2)}	0,8 l	
	Fenvalérate	Sumicidin 10 ^{(1) (3)}	1,5 l	

(1) Risque de pullulation de pucerons — (2) 0,8 l en traitement précoce, 0,5 l en traitement classique — (3) Bonne efficacité s'il est appliqué à l'époque optimale.



Très bonne



Moyenne

■ **PUCERONS** : Les populations ont régressé grâce à l'action des microhyménoptères et des mycoses. On observe les premières larves de coccinelles, chrysopes et syrphes. Inutile d'intervenir pour l'instant.

POMME DE TERRE

■ **MILDIOU** :

Situation : De nombreux cycles de contamination sont arrivés à leur terme en début de mois d'où quelques taches foliaires dans les parcelles mal protégées. Ces taches constituent une source de contamination importante même si elles semblent desséchées. Dès la prochaine pluie, on risque d'assister à un développement intense de la maladie.

Préconisations : Il est impératif de maintenir la protection .

→ Si vous utilisez un fongicide pénétrant ou de contact, il faut renouveler le traitement si la parcelle a été soumise à un orage.

Suivez bien la météo ...